

Enfermedad

# Diverticular del Colón

• **Diverticulosis:** Es la presencia de divertículos en el colón

• **Enfermedad diverticular:** Signos y síntomas asociados a diverticulitis

• **Diverticulitis:** Inflamación de divertículos

↳ (No complicada: Sin absceso, ni perforación / Complicada: Absceso y perforación)

## Etiología

Hay aumento de la presión intraluminal, debilidad de la pared del colón, lo que forma hernias de mucosa y submucosa

→ **Diverticulitis:** COPROLITO INTRADIVERTICULAR

## Clínica

**Enfermedad diverticular:**

• Dolor crónico en fosa iliaca izquierda, sin fiebre ni leucos, puede haber sangrado leve

## Diverticulitis

• Dolor en FII, fiebre y leucos, irritación peritoneal y puede haber sangrado masivo

## Diagnóstico

Es clínico con apoyo de estudios de imagen

1. Tomografía abdominal
2. USG (si no hay TAC)

• **Laboratorios:** PCR > 50mg/dL es predictor de diverticulitis, BH, QS, radiografía de abdomen

## → EN SANGRADO DIVERTICULAR

• **Causa más frecuente:** Hemorragia masiva baja en pacientes mayores de 60 años, el 70% proviene de divertículo derecho NO inflamado

• **Durante el sangrado:** si el paciente esta estable se realiza una colonoscopia pero si esta inestable, es de elección realizar arteriografía y embolización o considerar una cirugía urgente. En caso de dos hemorragias masivas, se realiza hemocolectomía derecha masiva

## Epidemiología

- 95% afecta al colón sigmoide
- 10-15% presentan diverticulitis > 62 años

## Clasificación

Se utiliza Hinchey para TAC (para establecer la extensión de la enfermedad)

## Tratamiento

### Quirúrgico de urgencia

- 1ra elección: Resección de sigmoide con anastomosis primaria e ileostomía protectora
- 2da elección: Procedimiento de Hartmann

(Se realiza de urgencia en peritonitis, ya que es un Hinchey III ó IV, pero si es un Hinchey I ó II y no mejora en 24hrs con tratamiento conservador se realiza el tratamiento quirúrgico)

### Tratamiento quirúrgico electivo

#### -Sigmoidectomía (laparoscópica)

- En pacientes con fístula, estenosis ó sospecha de cáncer, hacer cirugía electiva

